

**CONSENTIMIENTO INFORMADO
VACUNACIÓN MENORES DE EDAD 5 A 11 AÑOS CONTRA LA COVID-19
INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNA SINOPHARM (Vacuna COVID-19)**

VENTAJAS DE LA VACUNACIÓN

- Las vacunas reducen el riesgo de que una persona se infecte por el virus (SARS-CoV-2) que causa la enfermedad por coronavirus (COVID-19).
- La protección óptima de la vacuna se consigue a los 7 días tras haber recibido la 2da dosis, aunque como cualquier otra vacuna, puede que no proteja totalmente a las personas vacunadas.
- La vacuna no puede provocar la enfermedad, COVID-19, en la persona que la reciba al contener solo parte de su material genético.
- La administración de dos dosis de vacuna reducirá la probabilidad de enfermar, de desarrollar enfermedad grave y de morir. Sin embargo, las personas vacunadas deben continuar, adoptando las medidas preventivas para reducir la transmisión (lavado de manos, uso de barbijo y distancia social).
- Se espera que con la inmunización que proporcionará la vacunación de toda o gran parte de la población pueda reducirse de forma notable y duradera el impacto de la pandemia.
- Los ensayos clínicos, en los que han participado, decenas y miles de personas, y los estudios disponibles han mostrado una elevada protección frente a la enfermedad en las personas que recibieron la vacuna. La Organización Mundial de la Salud, acredita la seguridad y eficacia de esta vacuna.
- Por ello la vacunación supone, según la evidencia científica actual, una actuación sanitaria beneficiosa tanto para la persona que la recibe como para la sociedad en su conjunto.

INCONVENIENTES DE LA VACUNACIÓN: REACCIONES ADVERSAS.

Al igual que con todos los medicamentos, al administrar una vacuna existe el riesgo de que el paciente presente algún evento adverso, los que normalmente son leves y se resuelven de manera espontánea, aunque también pueden ocurrir eventos serios, pero en menor frecuencia. También pueden presentarse eventos relacionados con el proceso de la vacunación, como, por ejemplo, temor, ansiedad o estrés a vacunarse, al respecto la OMS señala que podrían presentarse producto de la ansiedad, efectos como ser desmayos, hiperventilación, vómitos. Los eventos adversos más comunes son:

Muy frecuentes: Dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolor muscular, dolor en el lugar de inyección, cansancio, escalofríos, fiebre (mayor frecuencia tras la 2da dosis), hinchazón en el lugar de la inyección.

Frecuentes: Náuseas, enrojecimiento en el lugar de la inyección.

Poco frecuentes: Aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, insomnio, dolor en la extremidad, malestar, picor en el lugar de la inyección.

Estos efectos deberían desaparecer en unos días.

AUTORIZACIÓN DE LA VACUNACIÓN

Yopadre/madre/Tutor con CI/Pasaporte N°.....

AUTORIZO la vacunación de mi hija/ocon CI.....contra la COVID-19.

Firma:
.....

Padre/Madre o Tutor legal

RECHAZO A LA VACUNACIÓN ANTI – COVID – 19

Recibida la información sobre la vacuna, sus posibles reacciones desfavorables y quienes no deben vacunarse, Yo

.....padre/madre/Tutor con CI/Pasaporte N°.....

RECHAZO la vacunación de mi hija/ocon CI.....contra la COVID-

19. Firma:
.....

Padre/Madre o Tutor legal

La Paz.....de..... del 202.....